

種名	科名	花期	原産地	特徴	写真
ノヂシャ	オミナエシ	5-6月	ヨーロッパ	葉は対生。高さ10-35cm 冬はロゼット形成。 枝先に2mmの淡青色の5裂した筒型の花を固めてつける。	
ナガミヒナゲシ	ケシ	3-5月	地中海沿岸	茎は20-60cm。 下半部に開出毛。 根生葉はロゼット状。 葉は深裂し互生。 橙紅色の花弁4枚。	
ハルジオン	キク	4-6月	北アメリカ	30-60cm。 茎につく葉は葉柄なし。茎をだく。 茎は中空。蕾のときうなだれる。 白~淡紅色の花。	
ユウゲショウ (アカバナユウゲショウ)	アカバナ	5-9月	北アメリカ	茎は基部で分岐。葉は互生。 1.5cmの淡紅色の4弁花。 雌しべの先端は紅色で4裂。 雄しべは8個。高さ20-40cm。	
ヒメオドリコソウ	シソ	4-5月	ヨーロッパ	茎は四角形。10-25cm。 葉は対生。網目状の脈が目立つ。 葉は赤紫色を帯びる。 淡紅色の唇形花が葉の間から顔をのぞかせる。	
アメリカフウロ	フウロソウ	5-6月	北アメリカ	全体に白い軟毛。 茎は基部から分岐。 葉は長い柄があり、5-7深裂。 淡紅色~白の5弁花。1cm程度	
ショカツサイ (ムラサキハナナ) (ハナダイコン) (オオアラセイトウ)	アブラナ	3-4月	中国	茎は上部で分岐。高さ60cm。 根生葉と下部の葉は深裂。 上部の葉は長楕円形。互生。 赤紫色の4弁花。	
ムシトリナデシコ	ナデシコ	5-7月	地中海	茎は直立し上部で分岐。 高さ30-70cm。 茎の節間に粘液を出す。 先端に紅色~淡紅色の花を蜜につける。葉は対生。	
マツバウンラン	ゴマノハグサ	5-6月	北アメリカ	茎は細く基部で分岐。20-50cm。 枝についた葉は細い。 茎の上部に青紫の花をつける。	
ニワゼキショウ	アヤメ	5-6月	北アメリカ	高さ10-20cm。葉は扁平で、基部を抱く。 1.5mmの6弁花。紫色の筋。 花被片は赤紫色。	
オオキンケイギク	キク	5-8月	北アメリカ	葉は対生、一部互生。 花の色は橙黄色。 花床に細長い鱗片 高さ30-70cm。 頭花の舌状花は4-5裂する。	
ツルニチニチソウ	キョウチクトウ	4-7月	ヨーロッパ	株元からほふくして茎が伸びる。 葉には光沢あり。斑入りもある。 葉は対生で全縁。 3cmの青紫色の花。5裂する。	

